

بیماری‌های دهان و فک و صورت

۱- آقای ۳۰ ساله مکرراً در طول سال گذشته، ۲ هفته بعد از ایجاد تبخال دچار کراست خون چکان لب، اریزیون‌های منتشر و زخم‌های بزرگ و دردناک دهانی شده است. مناسب‌ترین دارو برای سرکوب این حملات کدام است؟ (برکت)

آزاتیوپرین

والاسیکلویر

دایپسون

هیدروکسی کلروکین

۲- سندرم رمزی هانت در اثر درگیری کدام گانگلیون با عفونت هرپس زوستر ایجاد می‌شود؟ (برکت)

Geniculate

Trigeminal

Gasserian

Sphenopalatine

۳- کدام روش جهت افتراق شروع عفونت فعال ناشی از HSV باریزش بدون علامت و ویروس در بزاق، مناسب‌تر است؟ (برکت)

Polymerase Chain Reaction

Indirect Immunofluorescent

Hybridization Technique

Western Blot

۴- طبق نتایج مطالعات بالینی، کدام یک از طریق کاهش سیتوکین‌های پیش التهابی، بروز و شدت زخم‌های دهانی را در سندرم بهجت کم می‌کند؟ (برکت)

Apremilast

Thalidomide

Dapsone

Pentoxifylline

۵- زخم‌های گسترده دهانی در فرم کلاسیک اپیدرمولیز بولوز اکتسابی، به صورت تیپیک در کدام ناحیه رخ می‌دهد؟ (برکت)

زبان

کام نرم

کف دهان

لثه

۶- برای بررسی میزان پیشرفت بیماری در طول درمان در فرد مبتلا به پمفیگوس از چه تکنیکی استفاده می‌شود؟ (برکت)

تست ایمونوفلورسنت مستقیم

ارزیابی هیستوپاتولوژیک

تیترا آنتی‌بادی علیه دسموگلین

رسوب IgG در بالای لایه بازال

۷- برای تشخیص کدام ضایعه نکروتیک دهانی به بیوپسی خارج دهانی نیاز است؟ (برکت)

سیالومنتاپلازی نکروزان

آرتریت ژانت سلی

زخم ائوزینوفیلیک

عفونت سایتومگالوویروس

۸- در درمان Median Rhomboid Glossitis کدام مورد بیشتر توصیه شده است؟ (برکت)

کرایو تراپی

برداشت جراحی

دهانشویه نیستاتین

کپسول فلوکونازول

۹- کدام مورد ممکن است منجر به علامت دار شدن لکوپلاکیای موئی در بیمار مبتلا به ایدز شود؟ (برکت)

سوپراینفکشن با کاندیدا

ازدیاد کراتوز پاپی فیلیفرم

گسترش ضایعه به دورسال زبان

همراه شدن با استرس‌های روحی

۱۰- همه موارد منجر به افزایش ریسک تبدیل به بدخیمی در لکوپلاکیا می‌گردد، بجز: (برکت)

بوردر مشخص

محل ضایعه

الگوی غیرهموژن

اندازه ضایعه

۱۱- خانمی متعاقب ترمیم زیبایی با کامپوزیت دچار نمای لیکنوئید و قرمزی در مخاط لب بالا شده است. درمان مناسب چیست؟ (برکت)

پماد تاکرولیموس

محلول دیفن هیدرامین

دهانشویه کلرهگزیدین

قرص آزاتیوپرین

۱۲- Oral Disease Severity Score (ODSS) در لیکن پلان دهانی شامل کدام مورد نمی‌باشد؟ (برکت)

کراتوز

اریتم

زخم

پیگمانتاسیون

۱۳- تمام موارد از مشخصات بالینی فیروز تحت مخاطی است، بجز: (برکت)

اریتم

پیگمانتاسیون

هیپرکراتوز

رنگ پریدگی مخاط

۱۴- آقای با عفونت قارچی دهانی، مراجعه کرده است. وی سابقه عفونت‌های قارچی در پوست سر و ناخن نیز دارد. افزایش کدامیک محتمل‌تر است؟ (برکت)

T4

TSH

PTH

LDL

۱۵- تغییر رنگ ناشی از مصرف کدام دارو ممکن است مدت زمان بیشتری پس از قطع مصرف آن در کام سخت باقی بماند؟ (برکت)

سیکلو فسفامید

هیدروکسی کلروکین

ضد بارداری خوراکی

کلپرومازین

۱۶- در توصیف ویژگی بالینی "ملانواکانتومای مخاط دهان" کدام گزینه صحیح است؟ (برکت)

حاشیه نامنظم

سطح زخمی

اغلب دردناک

رشد آهسته

۱۷- کدامیک از پیگمانتاسیون‌ها در کودکان و نوجوانان شایع‌تر بوده و در فصول بهار و تابستان، تیره‌تر است؟ (برکت)

Lentigine

Ephelis

Melanotic Macule

Nevus

۱۸- در سیستم TNM برای سرطان زبان، اولین مرحله‌ای که گسترش تومور به حنجره مشاهده می‌شود، مربوط به کدام T است؟ (برکت)

T2

T3

T4

T4a

۱۹- بیماری به دلیل رادیوتراپی سر و گردن دچار موکوزیت دردناک مخاط دهان شده است. برای شروع مدیریت درد وی، از کدام دارو استفاده می‌شود؟ (برکت)

ایبوپروفن

استامینوفن

مورفین

داکسپین

۲۰- ترکیب پنتوکسی فیلین و توکوفرول در درمان کدام عارضه دهانی تجویز می‌شود؟ (فلاس)

Hyposalivation

Jaw Osteonecrosis

Extensive Mucositis

Trismus

۲۱- در آقای با سابقه سرطان که کاندید دریافت بیس فسفونات تزریقی می‌باشد، مناسب‌ترین فاصله زمانی کشیدن دندان قبل از تزریق چقدر است؟ (فلاس)

۳-۵ روز

۷-۱۰ روز

دو هفته

یک ماه

۲۲- تظاهر بالینی متاستاز تومورهای بدخیم به استخوان‌های فک شامل تمام موارد می‌باشد، بجز: (برکت)

درد

پارستزی

تورم

زخم

۲۳- داروهای mTOR Inhibitors در درمان سرطان، موجب بروز کدام عارضه دهانی می‌شوند؟ (فلاس)

کاندیدیاژیس

خونریزی مخاطی

موکوزیت

خشکی دهان

۲۴- در کودک مبتلا به فلج مغزی که دچار سیالوره می‌باشد، مناسب‌ترین شیوه درمان برای کاهش ترشح بزاق کدام است؟ (برکت)

قطع عصب تیمپانیک

تجویز گلیکوپیرولات

بستن مجرای غده تحت فکی

تزریق سم بوتولینیوم

۲۵- پسر ۱۴ ساله‌ای با شکایت از بروز یک برجستگی بدون درد در زیر زبان از یک ماه قبل، مراجعه نموده که در معاینه کلینیکی یک توده با قوام نرم موج و پولیپوئید به قطر تقریبی یک سانتی‌متر با ته رنگ آبی در سطح شکمی زبان مشاهده می‌شود. بهترین تشخیص کدام است؟ (برکت)

لنفانژیوما

همانژیوما

موکوسل

کیست اپیدرموئید

۲۶- سیالوگرافی غدد پاروتید در کدام یک از موارد، دیلاتاسیون غیرطبیعی مجاری بزاقی را نشان می‌دهد؟ (برکت)

Sarcoidosis

Anorexia Nervosa

Chronic Alcoholism

Sjögren's Syndrome

۲۷- در خانم ۵۶ ساله دیابتیک، آنتی بیوتیک مناسب برای سیالادنیت باکتریال در صورت حساسیت به پنی‌سیلین کدام می‌باشد؟ (برکت)

سفازولین

جنتامایسین

آزیترومایسین

سیپروفلوکساسین

۲۸- لنفوم و نوروپاتی محیطی در سندرم شوگرن اولیه با کمبود کدام ویتامین در ارتباط می‌باشد؟ (برکت)

D

B

A

E

۲۹- خانم مبتلا به آرتریت TMJ و مفاصل اندام تحتانی، ورم ملتحمة چشم و زخم‌های سطحی دهانی مراجعه کرده است. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟ (برکت)

Rheumatoid Arthritis

Psoriatic Arthritis

Osteoarthritis

Reactive Arthritis

۳۰- پسر ۱۶ ساله‌ای با شکایت از درد جلوی گوش و محدودیت باز کردن دهان مراجعه نموده است. در معاینه بالینی بیمار دچار میکروگناسی و اپن بایت قدامی بوده و با لمس جلوی گوش در دو طرف، درد احساس می‌شود. بررسی آزمایشگاهی نشان دهنده افزایش ESR و CRP می‌باشد. بهترین تشخیص کدام است؟ (برکت)

آرتریت ایدیوپاتیک جوانان

کندروماتوز سینوویال

اسکلروز سیستمیک

سندرم رایتر

۳۱- محدودیت حرکات فک به سمت مبتلا در کدامیک از اختلالات TMD می‌تواند رخ دهد؟ (برکت)

استئوآرتریت

آرتریت عفونی

هیپوپلازی یک طرفه کندیل

جابجایی خلفی دیسک

۳۲- خانم جوانی با سردرد شدید و اختلال در بینایی به طور همزمان دچار انحراف دو چشم به سمت داخل شده و حرکت چشم به سمت بیرون برایش سخت شده است. محتمل ترین عامل سردرد کدام است؟ (برکت)

خونریزی غیر تروماتیک ساب آراکنوئید

آرتريت ژانت سلی

افزایش ایدیوپاتیک فشار داخل جمجمه

نئوپلاسم داخل جمجمه

۳۳- بیماری با شکایت از اینکه هنگام حرکات فکی و بلع دچار دردهای تیرکشنده، کوتاه مدت و نسبتاً شدید در ناحیه زیر گوش و خلف فک پائین می‌شود، مراجعه کرده است. کدام نورالژی محتمل تر است؟ (برکت)

تری ژمینال

گلو سوفارنژیال

ژنیکولیت

اکسیپییتال

۳۴- خانمی ۶۱ ساله مبتلا به نورالژی تری ژمینال بعد از تجویز کاربامازپین همچنان از درد شکایت دارد. افزودن کدام یک می‌تواند درد بیمار را کاهش دهد؟ (برکت)

باکلو فن

لاموتریژن

فنی توئین

توپیرامات

۳۵- ویژگی‌های علائم سندرم سوزش دهان، در کدام یک به درستی بیان شده است؟ (برکت)

معمولا یک طرفه

افزایش شدت در طول روز

پیروی از مسیر یک درماتوم

داشتن حالت حمله‌ای

۳۶- در کلیشه پانورامیک از خانم ۵۰ ساله به دلیل فالوآپ ضایعاتی با تشخیص Focal Cemento Osseous Dysplasia، ضایعه جدید لوسنت با حاشیه مشخص و در برخی نواحی Scalloped از مزیدال پره مولر اول مندیبل تا دیستال مولر سوم همان سمت مشاهده شده است. محتمل ترین تشخیص افتراقی کدام است؟ (وایت)

Simple Bone Cyst

Odontogenic Keratocyst

Odontogenic Myxoma

Glandular Odontogenic Cyst

۳۷- شایع ترین یافته بالینی در سنترال ژانت سل کدام است؟ (وایت)

تورم

تغییر رنگ بنفش

درد

حساسیت به لمس

۳۸- بررسی تاریخچه فامیلیال و احتمال پولیپ‌های کولون در صورت تعدد کدامیک، مطرح می‌باشد؟ (وایت)

Hypercementosis

PCOD

Idiopathic Osteosclerosis

Cementoblastoma

۳۹- محتمل‌ترین تشخیص در بیماری با لوسنسی‌های متعدد فکی در کلیشه پانورامیک و سابقه BCC پوستی، کدام است؟ (وایت)

ادونتوژنیک کراتوسیست

کیست دنتی ژور

سنترال ژانت سل گرانولومای مرکزی

مالتیپل میلوما

۴۰- در کدامیک، احتمال همراهی با نورالژی بیشتر است؟ (وایت)

نوروفیبروما

نوروما

شوانوما

میگزوما

۴۱- احتمال عود در کدامیک از تومورها از بقیه بیشتر است؟ (وایت)

Central Odontogenic Fibroma

Odontogenic Myxoma

Neuroma

Neurofibroma

۴۲- حدود مشخص واسکالوپ در نمای رادیوگرافی برای همه ضایعات مطرح می‌شود، بجز: (فارو)

Glandular Odontogenic Cyst

Keratodontogenic Tumor

Calcifying Odontogenic Cyst

Odontogenic Myxoma

۴۳- تحلیل ریشه بصورت Spiking در نمای رادیوگرافی کدام ضایعه ممکن است دیده شود؟ (نویل)

استئوما

استئوسارکوما

آملوبلاستیک فیبروما

اسی فائینگ فیبرومای جوانان

۴۴- نمای Salt and Pepper در رادیوگرافی جمجمه کدام بیماری دیده می‌شود؟ (وایت)

هیپریپاراتیروئیدیسم

استئوپتروزیس

هیپوفسفاتازیا

لانگرهانس سل

۴۵- دندان سانتال فک بالای کودکی، بزرگ و به شکل دو تایی بوده و تعداد دندان‌ها نیز طبیعی است. دقیق‌ترین توصیف کدام است؟ (نوئل)

Fusion

Gemination

Concrescence

Supernumerary

۴۶- رنگ متمایل به زرد از تظاهرات بالینی کدام ضایعه نیست؟ (برکت)

تومور گلوموس

لیپوما

کیست لنفوای تلیال

گرانولرسل تومور

۴۷- بیمار جوانی با دندان‌های طبیعی، مبتلا به هیپرپلازی پاپیلاری کام شده است. پرسش در خصوص وجود کدام سابقه لازم می‌باشد؟ (نوئل)

تنفس دهانی

آلرژی

ترومای فکی

ارتودنسی ثابت

۴۸- بیمار ۶۰ ساله متعاقب استفاده از دنچر جدید فک پایین، درد شدید ضربان داری را در سمت چپ فک ذکر می‌کند. در معاینه ندولی همرنگ مخاط نرمال در عمق وستیبول محاذات دندان ۵ پایین دیده شد. سابقه جراحی پیش پروتزی در ۶ ماه قبل در موضع اعلام گردید. محتمل‌ترین تشخیص چیست؟ (نوئل)

Traumatic Neuroma

Pleomorphic Lipoma

Neurofibroma

Malignant Schwannoma

۴۹- کدام قسمت از مندیبل معمولاً در چروبیسم درگیر نمی‌شود؟ (نوئل)

راموس صعودی

کندیل

زائده کروئوئید

زاویه مندیبل

۵۰- در رادیوگرافی پری‌اپیکال فرد ۲۰ ساله، تخریب لوکالیزه استخوان آلوئول که از سطح میانی ریشه دندان‌های مولر یک سمت فک پایین شروع شده، مشاهده گردیده است. تاریخچه‌ای دال بر هیچ گونه درگیری پوست یا علامت سیستمیک وجود ندارد. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟ (برکت)

سندرم پاپیلون لفور

نوتروپنی دوره‌ای

اُتوزینوفیلیک گرانولوما

پریودونتیت پیشرفته

۵۱- شایع‌ترین ناحیه بروز ضایعات متاستاتیک در دهان کدام است؟ (نویل)

زبان

کف دهان

کام

لثه

۵۲- خانمی ۳۶ ساله با دریچه مصنوعی قلب، در حال حاضر برای عفونت سینوس، کوآموکسی کلاو مصرف می‌کند. برای پروفیلاکسی قبل از اقدامات دندانپزشکی، تمام داروها قابل تجویز می‌باشد، بجز: (فالاس)

آزیترومایسین

کلاریترومایسین

داکسی سیکلین

سفازولین

۵۳- کدام داروی ضد پرفشاری خون اثر Sedative نیز دارد؟ (فالاس)

فوروزماید

کاپتوپریل

کلونیدین

مینوکسیدیل

۵۴- در خانم ۵۹ ساله با سابقه مصرف کاپتوپریل، احتمال بروز تمام علائم بالینی وجود دارد، بجز: (فلاس)

افزایش حجم لثه

آنژیوادم لب‌ها

سوزش دهان

تغییر حس چشایی

۵۵- برای کنترل درد پس از درمان ریشه دندان در بیماری با سابقه MI در سال گذشته، از تجویز کدام دارو باید اجتناب شود؟ (فلاس)

استامینوفن

ایبوپروفن

ناپروکسن

آسپرین

۵۶- کدامیک از علایم مسمومیت با دیگوکسین محسوب می‌شود و دندانپزشک باید بیمار را به پزشک ارجاع دهد؟ (فلاس)

تنگی نفس

اختلال بینایی

رنگ پریدگی

اختلال شنوایی

۵۷- آقای ۴۶ ساله مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی که آپیکسابان استفاده می‌کند، نیاز به جراحی دندان عقل نهفته دارد. در صورت تأیید پزشک معالج قطع مصرف آپیکسابان از چند روز قبل توصیه می‌شود؟ (فلاس)

یک هفته

پنج روز

سه روز

یک روز

۵۸- بیماری با تاریخچه آسم و تحت درمان با اسپری آلبوترول برای جراحی لثه مراجعه نموده است. چندین کارپول بی‌حسی حاوی اپی‌نفرین برای ایشان تزریق شده است. وی در معرض خطر کدام یک می‌باشد؟ (برکت)

سنکوپ

کاهش فشار خون

آریتمی

سر درد شدید

۵۹- همه علائم دهانی می‌تواند در بیمار مبتلا به TB فعال رخ دهد، بجز: (فلاس)

زخم دردناک و عمیق

استئومیلیت فکی

لنفادنوپاتی بزرگ و دردناک

پلاک سفید در کام نرم

۶۰- در آقای مبتلا به COPD که با درد دندانی و $FEV1 = 40\%$ و نسبت $FEV1 / FVC = 0.5$ مراجعه نموده، تجویز کدام مورد مجاز است؟ (فالاس)

آرام بخشی با N2O2

استامینوفن کدئین

ایبوپروفن

اکسیژن 4L/min

۶۱- در بررسی آزمایشگاهی بیماری ۴۲ ساله متوجه نتایج زیر شده‌ایم:

HBsAg⁻, HBcAb⁺, HBsAb⁺

تفسیر نتایج چیست؟ (برکت)

Immunity From Natural Infection

Immunity From Vaccination

Recovering From Acute Infection

Low-Level Chronic Infection

۶۲- پس از دریافت آنتی‌بیوتیک برای درمان آبسه دندانی، بیمار دچار تب، دل درد و اسهال خونی شده است. تجویز کدام دارو جهت درمان علائم گوارشی، مناسب تر است؟ (فالاس)

کلیندامایسین

تتراسایکلین

وانکومایسین

پنی‌سیلین

۶۳- در آقایی مشکوک به کبد چرب غیرالکلی، احتمال تغییرات بدرنگی پوست در کدام نواحی بیشتر است؟ (فلاس)

گردن

سینه

پا

تناسلی

۶۴- ضایعات پیواستوما تیت وژ تانس در خانم مبتلا به بیماری التهابی روده، در کدام ناحیه بندرت دیده می‌شود؟ (فلاس)

لثه

زبان

لب

کام

۶۵- برای درمان انتخابی دندانپزشکی، جهت تعیین شدت کولیت اولسراتیو، اندازه‌گیری کدام یک ضروری نمی‌باشد؟ (فلاس)

دمای بدن

میزان هموگلوبین

سدیماننتاسیون اریتروسیت‌ها

کراتینین سرم

۶۶- ابتلای دهانی در کدام عفونت می‌تواند در تشخیص افتراقی با اسکواموس سل کارسینوما قرار گیرد؟ (فلاس)

سیفیلیس

سوزاک

منونوکلئوز عفونی

هرپس سیمپلکس

۶۷- برای پرسش تحقیقاتی ذیل کدام نوع تحقیق مناسب تر است؟

"تاثیر اتاق اکسیژن هیپرباریک جهت پیشگیری از بروز استئونکروز فکی در بیماران کانسرسر و گردن که تحت درمان رادیوتراپی قرار می‌گیرند چیست؟" (برکت)

Cohort

Randomized trial

Case control

Cross sectional

۶۸- صحیح ترین رویکرد در برخورد با ضایعه دهانی که تشخیص بالینی آن پاپیلوما می‌باشد، کدام است؟ (برکت)

لیزر تراپی

کرایوتراپی

برش جراحی

واکسن HPV

۶۹- در کدام یک از عفونت‌های قارچی در صورت ابتلای استخوان کام، امکان نایبایی و پروپتوزیس وجود دارد؟ (برکت)

موکورمایکوزیس

بلاستومایکوزیس

آسپرژیلوس

هیستوپلاسموزیس

۷۰- توزیع یک طرفه کدامیک از انواع مالفورماسیون عروقی، از مسیر عصب تری ژمینال پیروی می‌کند؟ (برکت)

Arteriovenous

Capillary

Venous

Intraosseous Vascluar

۷۱- شایع‌ترین محل بروز رابدومیوسارکومای اطفال در کدام ناحیه است؟ (برکت)

لثه

کام

زبان

کف دهان

۷۲- همراهی زبان شیردار با کدامیک گزارش نشده است؟ (برکت)

زبان جغرافیایی

تریزومی ۲۱

ملکرسون - روزنتال

توبروس اسکروزیس

۷۳- در بیمار مبتلا به نارسایی کلیوی که میزان انفیلتراسیون گلومرولی وی کمتر از ۱۰ میلی‌لیتر در دقیقه است، تعدیل دوز آنتی‌بیوتیک‌ها ضروری است، بجز: (فلاس/برکت)

سفالکسین

آموکسی‌سیلین

مترونیدازول

کلیندامایسین

۷۴- انجام بیوپسی برای افتراق کدام نوع از استوماتیت اورمیک با بیماری‌های وزیکولوبولوز نیاز است؟ (برکت)

Hemorrhagic

Ulcerative

Hyperparakeratotic

Erythematous Membranous

۷۵- تمام گزینه‌ها از یافته‌های رادیوگرافیک استئودیستروپی کلیوی می‌باشند، بجز: (برکت)

دندان‌های شناور (Floating Teeth)

از دست رفتن حاشیه کورتیکال کانال مندیبولار

باریک شدن فضای لیگامان پریودونتال

نمای Ground Glass در استخوان‌ها

۷۶- خانمی ۲۵ ساله با سابقه دیابت تیپ ۱ و تزریق انسولین، با شکایت از آبسه دندانی و درد مراجعه کرده است. بعد از تزریق بی‌حسی بلاک و اقدام به کشیدن دندان، بیمار دچار افزایش سرعت تنفس و تعریق می‌شود. بهترین اقدام درمانی چیست؟ (فلاس)

تزریق انسولین

تزریق گلوکاگون

دادن آب میوه خوراکی

تزریق مجدد بی‌حسی

۷۷- خانم ۴۴ ساله مبتلا به پمفیگوس ولگاریس روزانه ۱۵ میلی گرم پردنیزولون مصرف می‌کند. وی نیازمند کشیدن دو دندان مولر فک پایین می‌باشد. بر اساس کتاب فلاس رعایت کدام یک از ملاحظات قبل از کشیدن دندان لازم است؟ (فلاس)

دریافت ۲۵ میلی گرم هیدروکورتیزون

دریافت ۵۰ میلی گرم هیدروکورتیزون

دو برابر کردن دوز روزانه پردنیزولون

مصرف دوز روزانه پردنیزولون

۷۸- تجویز اورژانس کدام مورد، مشترکا" برای کوما می‌گزدم و بحران تیروئیدیک توصیه شده است؟ (فلاس)

Propranolol

Propylthiuracil

Hydrocortisone

Potassium Iodide

۷۹- بیماری جهت کشیدن دندان به کلینیک مراجعه کرده است. در صورت مصرف پروپیل تیوراسیل احتمال بروز کدام مورد وجود دارد؟ (فلاس)

هیپوتانسیون ارتوستاتیک

خونریزی

عفونت

تاخیر در ترمیم زخم

۸۰- در سمت لینگوال ریج بی دندان فک پایین آقای ۷۰ ساله مبتلا به سرطان پروستات و تحت درمان با دنوزوماب، اکسپوز استخوانی به همراه درد و خروج چرک مشاهده می‌شود. کدام اقدام صحیح نمی‌باشد؟ (فلاس)

تجویز آنتی‌بیوتیک خوراکی

درخواست قطع دنوزوماب از پزشک

ساخت استنت آکریلی جهت پوشاندن ناحیه

خارج کردن فوری استخوان اکسپوز شده

۸۱- کدامیک از داروهای بی‌حسی موضعی جهت درمان پالپو تومی برای خانم باردار ارجح است؟ (فلاس)

آرتی کائین

بوپی واکائین

مپی واکائین

پریلوکائین

۸۲- نتایج آزمایشگاهی در آقای ۶۵ ساله نشان دهنده آنمی، لکوسیتوز، ائوزینوفیلی، افزایش ESR و ANCA مثبت است. یافته دهانی کاراکتریستیک در این بیمار کدام است؟ (برکت)

پاپول گوترون

پرفوراسیون کام

ژئوپیت توت فرنگی

واکنش لیکنوئیدی

۸۳- نرمال بودن CRP علی‌رغم بالا بودن ESR از مشخصه‌های بارز کدام بیماری است؟ (برکت)

لوپوس اریتماتو سیستمیک

آرتریت روماتوئید

آرتریت ژانت سلی

استئوآرتریت

۸۴- در بیمار دارای پروتز مفصل که کاندید جراحی دندان عقل است، همراهی همه موارد موجب تجویز آنتی‌بیوتیک بصورت پروفیلاکتیک خواهد شد، بجز: (فلاس)

دیابت نوع یک

تالاسمی

سوء تغذیه

لوپوس اریتماتوز سیستمیک

۸۵- بیماری متعاقب تزریق پنی‌سیلین دچار شوک آنافیلاکسی جنرالیزه شده و فشارخون وی به میزان ۹۰/۶۰ میلی‌متر جیوه کاهش یافته است. کدام مورد نباید تجویز شود؟ (برکت)

اکسیژن

فنیل‌افرین

اپی‌نفرین

آمینوفیلین

۸۶- پرفشاری خون و آریتمی در کدامیک از بیماری‌ها محتمل بوده و ملاحظات آن باید در حین درمان دندانپزشکی رعایت شود؟ (برکت)

آرتریت روماتوئید

درماتومیوزیت

فیبرومیالژیا

اسکلروز سیستمیک

۸۷- بیمار HIV مثبت با شکایت از درد و خونریزی لثه متعاقب مسواک زدن و افزایش جریان بزاق مراجعه نموده است. در معاینه بالینی لثه بین دندانی در چند نقطه ملتهب و زخم نکروتیک مشاهده می‌شود. پاکت عمیق وجود ندارد و بقیه مخاط و دندان‌ها سالم هستند. اولین اقدام کدام است؟ (فلاس)

دبریدمان و تجویز کلرهگزیدین

انجام بیوپسی از چند ناحیه

تجویز آسیکلوویر سه بار در روز

شمارش کامل سلول‌های خونی

۸۸- خانمی ۲۶ ساله با شکایت از سوزش و درد زبان مراجعه کرده است. در معاینه بالینی سطح زبان صاف و دپایه و مخاط رنگ پریده بوده و التهاب گوشه لب مشاهده می‌شود. در بررسی تاریخچه پزشکی، بیمار منوراژی، خستگی و تنگی نفس حین فعالیت دارد. افزایش کدام یافته آزمایشگاهی با علائم بیمار همخوانی دارد؟ (فلاس)

Cobalamin

TIBC

Ferritin

Bilirubin

۸۹- داکتیلیت از تظاهرات کدام آنمی می‌باشد؟ (فلاس)

فقر آهن

آپلاستیک

سیکل سل

تالاسمی

۹۰- دختری ۱۷ ساله مبتلا به کمبود G6PD به دلیل عفونت دندان‌نیاز به آنتی‌بیوتیک دارد. تمام موارد را می‌توان تجویز کرد، بجز: (فلاس)

آزیترومایسین

کلیندامایسین

مترونیدازول

پنی‌سیلین

۹۱- پسری ۱۴ ساله با شکایت از خونریزی لثه از ۳ هفته پیش مراجعه نموده است. تاریخچه پزشکی بیمار نشان دهنده تب، ضعف خستگی و تنگی نفس در هنگام فعالیت و پتشی در قسمت‌های مختلف پوست و مخاط می‌باشد. برخی یافته‌های آزمایشگاهی شامل:

WBC = 32000/mm³ , Plt = 15000/mm³ , Hb = 8gr/dl

می‌باشد. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟ (برکت)

ITP

AML

NHL

MM

۹۲- در کدام یک از انواع بیماری ون ویلبراند احتمال خونریزی خود به خود از مخاط دهان وجود دارد؟ (فلاس)

1

2A

2M

3

۹۳- بیماری که به علت اختلال ترومبوآمبولیک، وارفارین مصرف می‌کند، جهت کشیدن دندان سانترال فک بالا مراجعه نموده است. در صورتیکه INR = 2/5 باشد، مناسب‌ترین اقدام کدام است؟ (فلاس)

کشیدن دندان و استفاده از هموستاز موضعی

تجویز ویتامین K چند ساعت قبل از کشیدن دندان

قطع وارفارین و کشیدن دندان ۵ روز بعد

کاهش دوز وارفارین و تاخیر در کشیدن دندان

۹۴- چرا فرمالین در آماده‌سازی بافت برای مطالعه ایمونوهیستوشیمی بیماری‌های ایمونوبولوز مانند پمفیگوس یا پمفیگوئید، مناسب نیست؟ (برکت)

موجب رشد باکتری‌ها می‌شود.

باعث تخریب آنتی‌ژن می‌گردد.

باعث ضخیم شدن بافت می‌شود.

از تجزیه بافتی جلوگیری می‌نماید.

۹۵- در کدام حالت، نوتروفیل‌های نابالغ بیش از ۲۰ درصد مقدار نرمال، در خون محیطی یافت می‌گردند؟ (برکت)

عفونت باکتریال

آنمی مگالوبلاستیک

آنمی فقر آهن

اختلال کبدی

۹۶- استوماتیت آفتی از عوارض کدام یک از داروهای تجویزی در پیوند اعضا می‌باشد؟ (فلاس)

تاکرولیموس

سیکلوسپورین

سیرولیموس

آزاتیوپرین

۹۷- شایع‌ترین Oral Motor Dysfunction گزارش شده سالمندان چیست؟ (برکت)

Altered Mastication

Aspiration

Dysarthria

Tardive Dyskinesia

۹۸- بروز سندرم استیونس- جانسون در اثر دارو درمانی کدام یک از موارد شایع تر است؟ (فلاس)

صرع

میاستنی گراویس

آلزایمر

پارکینسون

۹۹- اسپاسم دردناک عضلات در کدام بیماری بروز می‌کند؟ (برکت)

دمانس

مالتیپل اسکلروزیس

سکته مغزی

میاستنی گراویس

۱۰۰- تجویز بی‌حسی موضعی حاوی اپی‌نفرین در بیماری که ۴ ساعت قبل کوکائین مصرف کرده، می‌تواند موجب همه عوارض گردد، بجز: (فلاس)

سکته مغزی

انفارکتوس میوکارد

آریتمی قلبی

هیپوتانسیون

پاسخ نامه اولیه مورد دندان پزشکی_ رشته بیماری های دهان و فک و صورت

۱	ب	۵۱	د
۲	الف	۵۲	د
۳	الف	۵۳	ج
۴	الف	۵۴	الف
۵	الف	۵۵	ب
۶	ج	۵۶	ب
۷	ب	۵۷	د
۸	د	۵۸	ج
۹	الف	۵۹	د
۱۰	الف	۶۰	ج
۱۱	ج	۶۱	الف
۱۲	د	۶۲	ج
۱۳	ج	۶۳	الف
۱۴	ج	۶۴	ب
۱۵	ج	۶۵	د
۱۶	الف	۶۶	الف
۱۷	ب	۶۷	ب
۱۸	ج	۶۸	ج
۱۹	الف	۶۹	الف
۲۰	ب	۷۰	ب
۲۱	ج	۷۱	ب
۲۲	د	۷۲	د
۲۳	ج	۷۳	د
۲۴	د	۷۴	ب
۲۵	ج	۷۵	ج
۲۶	د	۷۶	ج
۲۷	ج	۷۷	د
۲۸	الف	۷۸	ج
۲۹	د	۷۹	ج
۳۰	الف	۸۰	د
۳۱	د	۸۱	د
۳۲	ج	۸۲	ج
۳۳	ب	۸۳	الف
۳۴	الف	۸۴	ب
۳۵	ب	۸۵	د
۳۶	الف	۸۶	د
۳۷	الف	۸۷	الف
۳۸	ج	۸۸	ب
۳۹	الف	۸۹	ج
۴۰	ب	۹۰	د
۴۱	ب	۹۱	ب
۴۲	ج	۹۲	د
۴۳	ب	۹۳	الف
۴۴	الف	۹۴	ب
۴۵	ب	۹۵	الف
۴۶	الف	۹۶	ج
۴۷	الف	۹۷	الف
۴۸	الف	۹۸	الف
۴۹	ب	۹۹	ب
۵۰	ج	۱۰۰	د